

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że Miasto Sokołów Podlaski przyjęło „**Plan dystrybucji preparatu jodowego w przypadku zdarzeń radiacyjnych**”. W związku z tym, prosimy mieszkańców miasta Sokołów Podlaski o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie można się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach masowego przekazu z określeniem terminu rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie miasta Sokołów Podlaski.

Przyjęcie tabletek z jodkiem potasu przed wystąpieniem radioaktywnej chmury zapewni prawidłową ochronę przed napromieniowaniem tarczycy i wystąpieniem popromiennym rakiem tarczycy.

Rozmieszczenie punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie miasta

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, **ul. Polna 8;**
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, **ul. Węgrowska 22;**
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, **ul. Repkowska 3;**
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, **ul. Kupieżyńska 15;**
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, **ul. M. Skłodowskiej-Curie 16;**
6. Centrum Medyczne Starówka, **ul. Lipowa 5;**
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAX-MED”, **ul. Wolności 12;**
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPTIMA, **ul. M. Skłodowskiej-Curie
14 lok. 72**
9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMEGA, **ul. Węgrowska 5A.**

WYKAZ GRUP WIEKOWYCH OBJĘTYCH PROFILAKTYKĄ WRAZ ZE SPOSOBEM PODAWANIA I INFORMACJĄ O PREPARATACH JODOWYCH

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia preparat jodowy otrzymują wszystkie osoby do 60 roku życia.

NR GRUPY	WYSZCZEGÓLNIENIE GRUP RYZYKA	SPOSÓB PODANIA
1	Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia	Jednorazowo 1/4 tabletki. Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;
2	Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia	Jednorazowo 1/2 tabletki. Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;
3	Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat	Jednorazowo 1 tabletki. Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można pokruszyć i dodać do chłodnego napoju;
4	Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 lat	Jednorazowo 2 tabletki. Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem;
5	Kobiety w ciąży (każdy wiek)	Jednorazowo 2 tabletki. Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem;